

Patientvejledning: Gastroskopi (kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm)

Gastroskopi er en undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm, hvor man bruger en bøjelig kikkert, der føres ned via munden.

Før undersøgelsen:

Du skal faste, det betyder at du ikke må spise fast føde 6 timer før og drikke væsker 2 timer før undersøgelsen. Hvis du får medicin, du ikke kan undvære, kan du tage denne medicin med lidt vand om morgenen før undersøgelsen. Får du insulin, bedes du ringe og træffe særlig aftale. **Tager du blodfortyndende medicin (f.eks. Hjertemagnyl, Marevan eller Plavix), eller har pacemaker skal det oplyses klinikken i god tid før undersøgelsen.**

Undersøgelsen:

Inden undersøgelsen kan du få lokalbedøvende spray i svælget, så du nemmere kan synke slangen. Undersøgelsen foretages, mens du ligger på venstre side. Når kikkerten er ført ind i munden, skal du synke den, hvorefter spiserør, mavesæk og tolvfingertarm bliver eftersat. Med en lille tang, der føres ned gennem kikkerten, kan der – uden nogen smerte – tages vævsprøve til videre undersøgelse.

Efter undersøgelsen:

Hvis du har fået lokalbedøvelse i svælget, må du først spise og drikke 1½ time efter undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen får du med det samme. Er der taget vævsprøver, foreligger der svar efter 4-10 dage. Undersøgelsen varer 2-5 minutter.

Komplikationer

En gastroskopi er en ret sikker undersøgelse. I ekstrem sjældne tilfælde kan der forekomme komplikationer i form af blødning, eller hul på spiserør, mavesæk eller tolvfingertarm. Skulle opstå blodige opkastninger, sortfarvet afføring, stærke mavesmerter eller feber skal du straks kontakte klinikken. Uden for åbningstiden skal vagtlæge eller skadestue kontaktes.