

Patientvejledning: Operation i lokalbedøvelse

Før operationen:

Tager du blodfortyndende medicin (f.eks. Hjertermagnyl, Marevan eller Plavix), eller har pacemaker skal det oplyses klinikken i god tid før operationen.

Undlad at smøre creme på huden.

Operationen:

Huden desinficeres med klorhexidinsprit, jod eller lignende. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd nål, det svier og spænder ca. 1 minut. Man kan ved operationen ofte mærke berøring, men ikke smerte. Såret lukkes med en tråd, der skal fjernes efter 7-14 dage på klinikken eller hos praktiserende læge.

Efter operationen:

Lokalbedøvelsen holder i 2-6 timer. Med mindre andet er aftalt tages almindelig håndkøbsmedicin mod smerter 2 tabl. Pinex à 500 mg. og/ eller 2 tabl. Iprex à 200 mg. Forbindingen fjernes efter 3 dage (med mindre andet er aftalt). Ved behov kan såret derefter dækkes med Micropore (købes på apoteket). Restriktioner: Med mindre andet er aftalt, er der ingen restriktioner, dog frarådes badning i svømmehal og havvand, indtil trådene er fjernet.

Komplikationer:

I sjældne tilfælde kommer der blodansamling eller væskeansamling. Ansamlingen forsvinder ofte af sig selv efter nogle dage til uger. I meget sjældne tilfælde kommer der betændelse. I sjældne tilfælde hos enkelte patienter bliver ar grimme eller fortykkede. I yderst sjældne tilfælde udvikles en overfølsomheds reaktion mod lokalbedøvelse, dette kræver hurtig behandling eller eventuel indlæggelse på hospital. Ved tegn på større blødning, tiltagende smerter eller tegn på betændelse skal klinikken, vagtlæge eller skadestue straks kontaktes.